ISCISA ENFERMAGEM

Exame de Enfermagem 06.01.2016 Duração: 1h.30min

RESPONDA AS QUESTÕES ASSINALANDO A ALÍNEA CORRECTA NA SUA FOLHA DE RESPOSTAS. NÃO BORRE, USE LÁPIS HB, CANETA AZUL OU PRETA.

1. Anamnese é:
A. História das doenças de toda a família do paciente
B. História do prognóstico da doença actual
C. História atual do paciente
D. Conjunto de informações sobre os antecedentes, a história e os detalhes da doença.

2. Na coleta de urina de 24 horas, o enfermo deverá:
A. Desprezar o primeiro jacto da urina
B. Anotar desde o primeiro jacto da urina
C. Esvaziar a bexiga antes de iniciar o exame
D. Desprezar a urina da manhã, independente do início de exame.

3. A aplicação de uma medicação por via subcutânea num paciente caquético deverá ser feita:
A. Mantendo a pele comprimida por 30 segundos antes da administração do medicamento
B. Distendendo a pele num ângulo de 30°
C. Introduzindo a agulha com rapidez e firmeza utilizando o ângulo de 60°
D. Levantando e segurando a pele, administrando o medicamento na posição paralela

4. O desbridamento mecânico realizado pela equipe de enfermagem é um procedimento aplicado também a pacientes que apresentam o quadro de:
A. Queimaduras com presença de tecido morto
B. Fractura com exposição óssea
C. Traumatismo intra-abdominal
D. Hemorragia intracraniana

5. Com o objectivo de se evitar a bronco-aspiração no paciente torporoso, em que há lavagem gástrica, deve-se ter o cuidado de:
A. Controlar o volume líquido a ser administrado
B. Aquecer o líquido a ser infundido
C. Administrar medicação antiemética
D. Levantar a cabeceira do leito

6. O componente do sangue responsável pelo mecanismo de defesa do organismo é:
A. Eritrócito
B. Plasma
C. Leucócito
D. Hemoglobina

7. A nictúria é uma alteração orgânica que pode ser definida como:
A. Diminuição da micção nocturna
B. Diminuição da micção diúrna
C. Aumento da micção diúrna
D. Aumento da micção noturna

8. A febre é uma elevação patológica da temperatura corporal. Quando há período de elevação e queda brusca da temperatura, a febre é chamada de:
A. Intermitente
B. Recorrente
C. Remitente
D. Sustentada

9. No atendimento a vítimas com hemorragia, ao aplicar o torniquete, este deverá ser apertado o suficiente para controlar o fluxo de sangue arterial e afrouxado em intervalos, em minutos, de:
A. 10
B. 15
C. 20

D. 25

10. O decúbito do paciente acamado deverá ser mudado de duas em duas horas com o objectivo de prevenir:

A. Tromboses
B. Escaras
C. Atrofias
D. Artroses

11. A temperatura axilar é a mais comumente aferida em pacientes internados. Este local de aferição é contra-indicado em caso de:

A. Queimadura de tórax
B. Cirurgia abdominal
C. Extracção dentária
D. Cirurgia vascular
E. Cirurgia rectal

12. Quando dizemos que um paciente está com taquicárdia é porque o seu coração está:

A. Lento
B. Acelerado
C. Fraco
D. Nenhuma das alternativas anteriores

13. A diminuição da diurese de um paciente é chamada de:

A. Anúria
B. Poliúria
C. Disúria
D. Nictúria

14. Quando um paciente só consegue respirar melhor estando sentado, dizemos que ele está:

A. Apnéico
B. Eupnéico
C. Cheyne-Stokes
D. Nenhuma das alternativas anteriores

15. Ao administrar uma medicação intravenosa (IV), devemos fazê-lo:

A. Rapidamente, pois estamos com pressa.
B. Lentamente, pois toda e qualquer medicação deve ser feita dessa forma.
C. A velocidade não é importante e sim a prescrição
D. Nenhuma das alternativas anteriores

16. Quando dizemos que um paciente está hipotenso é porque sua pressão está:

A. Muito alta
B. Baixa
C. Normal
D. Oscilando muito

17. Em relação à aplicação de calor local, indique a opção incorreta:

A. Alivia espasmos musculares
B. Estimula a circulação e as glândulas sudoríparas
C. Acelera o processo de supuração.
D. Produz a vasoconstrição

18. A situação que ocasiona a diminuição da frequência do pulso é:

A. Febre
B. Hipotiroidismo.
C. C Infecção
D. Emoções

19. Na administração de medicamentos por via oral, não é indicado:

A. Colocar os medicamentos em copinhos ou caixinhas.
B. Perguntar o nome do paciente e certificar-se disso com o cartão ou relatório de enfermagem
C. Deixar o medicamento sobre a mesinha do paciente, quando ele estiver ausente.
D. Lavar os copinhos com água e sabão

20. Em pacientes ambulatoriais, a insulina deve ser administrada por via:

A. Oral
B. Intravenosa
C. Intradérmica
D. Subcutânea

21. A quimioterapia antineoplásica serve basicamente para:

A. Detectar um tumor em fase inicial
B. Retardar o processo das neoplasias malignas
C. Oferecer conforto ao paciente com baixa imunidade

D. Eliminar o tumor benigno

22. Em relação ao volume, o pulso pode ser cheio ou:
A. Filiforme
B. Dicrótico
C. Bradisfígmico
D. Rítmico

23. "Deu entrada na emergência um jovem vítima de acidente de bicicleta na via pública. Ao exame físico foram observadas lesões superficiais na região escapular e no joelho esquerdo do tipo atrito, não acompanhadas de perda de sangue." Em relação ao caso, as feridas apresentadas são do tipo:
A. Perfurante
B. Abrasiva
C. Contusa
D. Incisiva

24. Para registrar os sinais vitais, devem ser utilizados os seguintes impressos:
A. Folha única e evolução médica
B. Evolução de enfermagem e evolução médica
C. Gráfico de TPR e evolução de enfermagem
D. Plano assistencial e gráfico de TPR

25. A massagem de fricção após a Injeção IM visa:
A. Estancar o sangramento
B. Facilitar absorção do medicamento
C. Aliviar a dor local
D. Aumentar a acção da droga

26. A introdução de grande quantidade de líquido na veia denomina-se:
A. Enteróclise
B. Enema
C. Lavagem vesical
D. Venóclise

27. Na coleta de sangue venoso para exame, o garrote deve ser:
A. Retirado após a punção da veia
B. Mantido durante a punção da veia
C. Retirado e mantido alternadamente
D. Abolido, pois não há necessidade de seu uso.

28. O antitérmico é uma medicação:
A. Evacuadora
B. Neutralizadora
C. Sintomática
D. Antitóxica

29. Na aplicação de medicamentos por via intramuscular, são usadas soluções do tipo:
A. Irritantes
B. Isotônicas
C. Hipertônicas
D. Cáusticas

30. A leucocitose representa o aumento dos(as):
A. Glóbulos vermelhos
B. Plaquetas
C. Anticorpos
D. Glóbulos brancos

31. Os materiais utilizados para verificar os sinais vitais são:
A. Termômetro, tensiômetro, relógio de segundos e lápis bicolor
B. Termômetro, martelo para pesquisa de reflexos e relógio de segundos
C. Estetoscópio, esfignomanômetro, relógio de segundos e termômetro
D. Estetoscópio, tensiômetro, TPR e lápis bicolor

32. O pulso poplíteo é aferido na seguinte região:
A. Segundo espaço intercostal
B. Sob a mandíbula
C. Dorso do pé
D. Na região plantar

33. A hipoglicemia pode ocorrer quando o paciente recebe:
A. Dose insuficiente de insulina
B. Dose excessiva de insulina
C. Nenhuma insulina
D. Tratamento alternado de insulina

34. A região escapular corresponde à seguinte estrutura anatômica:

A. Omoplata
B. Ilíaco
C. Púbis
D. Pelve

35. Antes de administrar digitálico a um paciente, devemos verificar se:
A. A respiração está acelerada
B. O volume urinário está baixo
C. O pulso radial está abaixo de 60 bpm
D. A pressão arterial está abaixo do padrão normal

36. Homem, 32 anos, chega à Emergência na qual você está de plantão, trazido por terceiros, com quadro de coma. Você não tem elementos da história clínica do paciente e o mesmo, em um exame inicial, não apresenta sinais de trauma. A primeira medida a ser tomada pela equipe é:
A. Intubação orotraqueal
B. Quantificação do nível de glicose sérico
C. Administração de glicose hipertônica por via intravenosa
D. Tomografia computadorizada de crânio

37. Os registos feitos pela equipe de enfermagem são de suma importância para que se possa avaliar o quadro clínico do paciente. Em relação à folha de balanço hídrico, devem ser feitas as seguintes anotações:

A. Quantidade dos líquidos introduzidos, grau de aceitação e horário.

B. Quantidade dos líquidos administrativos por via parenteral, horário e gotejamento.

C. Características, horário e vias de administração e eliminação nas 24 horas.

D. Volume dos líquidos eliminados, suas características e horário, num período de 12 horas.

38. A medida mais importante na prevenção infecção no recém-nascido consiste em:

A. Sanificar o lactário semanalmente

B. Desinfectar o berçário semanalmente

C. Esterilizar as fraldas previamente

D. Lavar as mãos antes de manusear o bebê

39. Antes de iniciar qualquer cuidado de enfermagem com o paciente, o primeiro passo é:

A. Trocar a roupa de cama do paciente

B. Preservar a individualidade do paciente

C. Cobrir o paciente com lençol estéril

D. Lavar as mãos com água e sabão

40. A lavagem meticulosa das mãos pelos profissionais de saúde e visitantes contribui significativamente para a interrupção do ciclo da infecção:

A. Recorrente

B. Cruzada

C. Vertical

D. Concomitante