ISCISA –EXAME DE ADMISSÃO ENFERMAGEM GERAL(SÓ PARA ENFERMEIRO GERAL)

1. **A lavagem meticulosa das mãos pelos profissionais de saúde e visitantes contribui significativamente para a interrupção do ciclo da infecção:**
   A. Recorrente
   B. Cruzada
   C. Vertical
   D. Concomitante
2. **Lavar as mãos entre um cuidado de enfermagem e outro é importante para:**
   A. Manter a higiene das mãos
   B. Evitar a autocontaminação.
   C. Não contaminar o material
   D. Evitar a infecção cruzada e a autocontaminação
3. **Numa situação de emergência, em que há indicação de intubação endotraqueal, o paciente deverá ser colocado na seguinte posição:**
   A. Fowler, com a cabeça para o lado.
   B. Trendelenburg, com a cabeça flectida para frente.
   C. Horizontal, sobre uma superfície firme com a cabeça para trás.
   D. Lateral esquerda, sobre uma superfície flexível.
4. **A coleta de urina de 24 horas auxilia no diagnóstico de doenças do aparelho geniturinário, sendo imprescindível o seguinte cuidado:**
   A. Colectar a primeira urina da manhã
   B. Desprezar o primeiro jacto de urina
   C. Colocar o material em frasco estéril
   D. Reiniciar a colecta se alguma micção for desprezada
5. **Para realizar a glicosúria pelo método do clinitest, as quantidades necessárias de urina e água, respectivamente, são:**
   A. 5 gotas e 10 gotas
   B. 10 gotas e 5 gotas
   C. 10mL e 5mL
   D. 5mL e 10mL
6. **Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sangüíneo, veia ou artéria. Quando oriunda do pulmão denomina-se:**
   A. Metrorragia
   B. Hematêmese
   C. Aracnóide
   D. Hemoptise
7. **A perda da continuidade óssea, produzida de forma brusca e violenta como resultado de um traumatismo, denomina-se:**
   A. Concussão
   B. Contusão
   C. Entorse
   D. Fratura
8. **A densidade urinária, verificada por meio do urodensímetro, oscila, quando normal, entre:**
   A. 1.060 e 1.070
   B. 1.055 e 1.060
   C. 1.045 e 1.050
   D. 1.010 e 1.030
9. **A falta de função respiratória, por qualquer causa que se introduza no trajecto gasoso dos pulmões, entre o sangue e o ar ambiente, denomina-se:**
   A. Dispepsia
   B. Anorexia
   C. Asfixia
   D. Nenhuma das alternativas anteriores
10. **O eletrocardiograma fornece informações sobre:**
    A. Registro dos impulsos elétricos do coração
    B. Arritmia cardíaca de repetição
    C. Registro das incursões respiratórias
    D. Acidose respiratória
11. **Indique o procedimento que não deve ser realizado, ao prestar os primeiros socorros a uma pessoa intoxicada com soda cáustica:**
    A. Colocar a vítima com a cabeça mais baixa que o resto do corpo

B. Dar bastante água misturada com suco de laranja e/ou de limão
C. Provocar vômito com água e sal
D. Nenhuma das alternativas anteriores

12. A sensação de deslocamento do corpo em relação aos objetos ou vice-versa, além de náuseas e sensação de zumbidos nos ouvidos, sem perda da consciência, são sintomas característicos de:
A. Lipotimia
B. Síncope
C. Coma
D. Vertigem

13. A compressa quente visa promover ba-sicamente a:
A. Vasoconstrição
B. Pneumoconstrição
C. Vasodilatação
D. Todas estão correctas

14. A posição de Trendelenburg é indicada, entre outras, para:
A. Melhorar a troca gasosa nos pulmões
B. Melhorar a circulação de retorno dos membros inferiores
C. Diminuir a tosse produtiva
D. Nenhuma das alternativas anteriores

15. O choque anafilático é provocado pela:
A. Presença de pirogênio no medicamento
B. Superdosagem de medicação
C. Não aceitação do organismo em relação ao medicamento
D. Nenhuma das alternativas anteriores

16. Os ossos movimentam-se em relação uns aos outros através de:
A. Cartilagens
B. Curvas
C. Nervos
D. Músculos
E. Articulações

17. O termo utilizado para denominar retenção de gases no estômago e no intestino é:
A. Anosmia
B. Sialorréia
C. Tenesmo
D. Meteorismo

18. No exame da pele de um paciente podemos encontrar lesões que constituem acúmulos sólidos circunscritos. Essas lesões são denominadas:
A. Abscessos
B. Hematomas
C. Pústulas
D. Flictenas

19. A catecterização nasogástrica tem por finalidades:
A. Evitar diarréia e manter equilíbrio hidroeletrolítico
B. Reduzir estresse e evitar constipação intestinal
C. Retirar os fluidos do trato gastrintestinal e administrar medicamentos e alimentos (gavagem)
D. Evitar constipação intestinal e prevenir desconforto gástrico

20. Em pacientes acamados com incontinência urinária, o cuidado mais importante de enfermagem inclui:
A. Controle rigoroso de diurese
B. Restrição rigorosa de líquidos
C. Troca programada da roupa do leito
D. Cateterismo vesical

21. O cuidado de enfermagem a ser prestado ao paciente, na colheita de escarro para baciloscopia, é:
A. Fazer bochechos de água e ingerir seguir
B. Escovar os dentes e lavar a boca
C. Colocar o material em recipiente limpo
D. Promover meios para evitar a tosse

22. Ao prestar cuidados de emergência um paciente que sofreu uma fratura, deve-se:

A. Transportar o paciente em decúbito dorsal para proteger a fratura
B. Imobilizar o membro fraturado para transportar o paciente
C. Administrar sedativo para diminuir o estresse
D. Nenhuma das alternativas anteriores

23. O ponto básico da assistência de enfermagem com prioridade sobre todos os demais cuidados ao paciente com insuficiência respiratória é:
A. Manutenção das vias aéreas desobstruídas
B. Utilização de oxigênio nasal
C. Observação rigorosa da frequência respiratória
D. Humidificação do gás a ser administrado

24. São sinais de hipoglicêmia, além da sudorese:
A. Sonolência e hálito cetônico
B. Palidez e taquicárdia
C. Sonolência e bradicárdia
D. Hálito cetônico e cefaléia

25. Quando o paciente está com hipoglicêmia, ele deve:
A. Receber glicose
B. Ir ao hospital imediatamente
C. Ficar deitado em decúbito lateral
D. Tomar insulina habitual

26. Um dos objectivos do uso de ataduras é:
A. Favorecer a cicatrização da área lesada
B. Restringir ou impedir movimentos
C. Impedir a propagação de infecção em feridas sépticas
D. Economizar material esterilizado

27. É necessário fazer a colecta de escarro para cultura pela manhã, porque neste período o paciente está:
A. Com expectoração abundante
B. Descansado
C. Hidratado
D. Nenhuma das alternativas anteri

28. Para realizar de maneira eficiente respiração pelo método boca a b devemos colocar o paciente na posição:
A. Sentado
B. Em pé
C. Deitado em decúbito lateral
D. Deitado em decúbito dorsal

29. A dor é uma das maiores causas desconforto, que pode ser identificada através da conduta verbal e não-verbal. Se possível, deve-se estimular o paciente à descrição de sua dor, com o objectivo principal de identificar seguintes características:
A. Localização, intensidade e qualidade.
B. Profundidade, localização e dur
C. Localização, difusão e intensida
D. Profundidade, qualidade e duraç

30. Para que uma substância possa administrada por via intravenosa essencial que:
A. Não seja hemolítica
B. Seja cáustica
C. Não seja de fácil absorção
D. Contenha pirogênio

31. O primeiro cuidado a ser dado em caso de hemorragia externa por acidente é prioritariamente:
A. Instalar soro removendo a vítim local
B. Cobrir o sangramento, apertand com firmeza o vaso afetado.
C. Manter o volume sangüíneo atra de transfusão
D. Imobilizar o membro lesado par i-nuir a perda de sangue

32. São complicações dos usuários insulina:
A. Dor no local da aplicação
B. Lipodistrofia insulínica
C. Edema insulínico
D. Somente B e C estão corretas

33. Na desinfecção por glutaraldeído a 2% o cuidado prévio com os materiais é fazer:
A. Limpeza
B. Estocagem
C. Esterilização
D. Registo

34. A acção de enfermagem imediata, prestada a um paciente que será submetido à intubação orotraqueal, é:
A. Fixar o tubo
B. Providenciar aspirador
C. Humedecer a região local
D. Retirar prótese dentária

35. A tapotagem tem, entre outros objectivos, o de melhorar a capacidade ventilatória, devendo ser praticada em pacientes no caso de:
A. Coma diabético
B. Transoperatório
C. Insuficiência renal
D. Secreção brônquica

36. Ao suspeitar de uma reacção transfusional num paciente que esteja a receber hemoderivados, o enfermeiro deverá adoptar as seguintes atitudes:
A. Manter a transfusão, chamar o médico e aquecer o paciente.
B. Manter a transfusão, guardar a embalagem do sangue e aquecer o paciente.
C. Interromper a transfusão, desprezar a embalagem de sangue e comunicar ao médico.
D. Interromper a transfusão, comunicar ao enfermeiro chefe e guardar a embalagem do sangue.

37. Colocar o paciente erecto com pernas e pés para baixo, administrar oxigênio, aplicar torniquetes rotativos e administrar medicação prescrita são cuidados de enfermagem adequados à seguinte situação:
A. Hemotórax
B. Bronquiectasia
C. Enfisema pulmonar
D. Edema agudo de pulmão

38. Em relação à aplicação de calor local, indique a opção incorreta:
A. Alivia espasmos musculares
B. Estimula a circulação e as glândulas sudoríparas
C. Acelera o processo de supuração.
D. Produz a vasoconstrição

39. Na administração de medicamentos por via oral, não é indicado:
A. Colocar os medicamentos em copinhos ou caixinhas.
B. Perguntar o nome do paciente e certificar-se disso com o cartão ou relatório de enfermagem
C. Deixar o medicamento sobre a mesinha do paciente, quando ele estiver ausente.
D. Lavar os copinhos com água e sabão